



RAIGRÁS HÍBRIDOS

Las características favorables del raigrás italiano y el ballico perenne se combinan en el raigrás híbrido. El raigrás híbrido tiene un desarrollo más rápido que el raigrás perenne y en buenas condiciones brinda una alta producción durante 3 a 4 años. La resistencia al invierno es mejor que el raigrás italiano.

ACROBAT

Es un pasto híbrido de tipo Italiano, de rápido establecimiento muy resistente a la roya, abundante de alto rendimiento. La excelente calidad, sanidad, y palatabilidad de este pasto hace que sea atractivo para el consumo del ganado. Es recomendado para todo tipo de ganado y tipo de manejo; pastoreo, ensilado o heno, y se recuperará rápidamente después del pastoreo

BOXER

Este híbrido tipo tetraploide perenne es sobresaliente por su fuerte establecimiento temprano y su alto vigor, buena sanidad y resistencia a la roya, incluso en entornos subóptimos, esta variedad tiene un excelente rendimiento. Es adecuado tanto para pastoreo como para cortes o ensilaje y produce rendimientos muy altos durante toda la temporada.

BUFALO

Búfalo combina el crecimiento otoñal temprano y fuerte de los italianos con una cobertura del suelo

muy buena comparable a los perennes. Eso le hace una variedad excelente comparada con otros tipos intermedios. La altura de crecimiento es relativamente alta con una buena resistencia de alojamiento, es resistente a la roya y otras enfermedades.

COLUMBIA

Raigrás híbrido de alto rendimiento y larga duración. Fácil establecimiento de la pradera expresando su vigor híbrido con mayor producción de materia seca. Exuberante follaje y hojas grandes. Su apropiado manejo proporciona mayor contenido de azúcar. La duración de este pasto de 4 - 5 años.

SABANA

Raigrás intermedio híbrido con calidad superior de forraje y buena persistencia. Adaptado para corte y pastoreo. De rápido establecimiento. Alta tolerancia al verano y roya. El crecimiento después de corte viene con menos tallos produciendo forraje de mayor calidad. Asocia muy bien con otros pastos y leguminosas. Duración de la pradera de 2 - 3 años.

